

Postpartum Preeclampsia

What is it?

Postpartum preeclampsia is a serious disease related to high blood pressure. It can happen to anyone who has just had a baby **up to 6 weeks after the baby is born.**

Risks to You

- Seizures
- Organ damage
- Stroke
- Death

Warning Signs



Stomach pain



Severe headaches



Feeling
nauseous or
throwing up



Seeing spots
(or other
vision changes)



Swelling in your
hands and face



Shortness
of breath

What can you do?

- Ask if you should follow up with your doctor within one week of discharge.
- Keep all follow-up appointments.
- Trust your instincts.

- Watch for warning signs. If you notice any, call your doctor. If you can't reach your doctor, call 911 or go directly to an emergency room and report you have been pregnant.



For more information, go to www.stillatrisk.org



Preeclampsia Posparto

¿Qué es?

La preeclampsia posparto es una afección grave relacionada con la presión arterial alta. Le puede suceder a cualquier persona que acaba de tener un bebé hasta la semana 6 después de que el bebé nazca.

Riesgos para usted

- Convulsiones
- Daño a órganos
- Accidente cerebrovascular
- Muerte

Signos de Advertencia



Dolor de Estomago



Dolores de cabeza graves



Sentir nauseas o vomitar



Ver manchas (u otros cambios en la visión)



Hinchazón en las manos o en la cara



Dificultad para respirar

¿Qué puede hacer?

- Consulte si debería hacer un seguimiento con su médico a la semana del alta.
- Continúe con todas las consultas de seguimiento.
- Confíe en sus instintos.

- Esté atenta a los signos de advertencia. Si nota alguno, llame a sus médicos. Si no puede contactarse con su médico, llame al 911 o vaya a la sala de emergencias e informe que ha estado recientemente embarazada.



Para más información, visite www.stillatrisk.org

